

VACCINATION

feuille d'information et de prescription

(Biothérapies, immunosuppresseurs, autres situations particulières à la demande de votre médecin)

Avec la prise de certains médicaments, ou dans certaines situations médicales particulières, une mise à jour de la vaccination est recommandée.

La démarche à suivre pour se faire vacciner varie d'une région à l'autre.

Pour savoir comment procéder pour vous faire vacciner, rendez-vous sur le site Clic Santé : <https://portal3.clicsante.ca>.

Vous pouvez aussi appeler **Info-Santé 811** pour connaître le lieu de vaccination le plus près de chez vous.

Idéalement, la vaccination se fait **14 jours avant** le début du médicament. Si vous recevez déjà un médicament dans la famille des biothérapies, les vaccins **INACTIVÉS** peuvent être reçus sécuritairement.

Si vous deviez recevoir un vaccin VIVANT ATTÉNUÉ :

Rougeole-rubéole-oreillons (RRO), fièvre jaune, typhoïde oral, BCG, Flumist (grippe intranasal) : il est recommandé de recevoir ces vaccins au moins 28 jours avant de débiter un traitement.

Varicelle : il est recommandé de le recevoir 6 semaines avant de débiter un traitement.

Si vous recevez déjà un médicament immunosuppresseur ou une biothérapie et que vous considérez recevoir un vaccin VIVANT ATTÉNUÉ, contactez votre médecin.

Prescription de la mise à jour du carnet de vaccination

Rx	Vaccins inactivés	Informations	Gratuit?
<input type="checkbox"/>	Influenza	<ul style="list-style-type: none">• Annuel contre la grippe• IM seulement	Oui
<input type="checkbox"/>	Tétanos	<ul style="list-style-type: none">• Entre 14 et 16 ans• 50 ans et + si pas reçu depuis 10 ans• Si enceinte, entre 26 et 32 sem	Oui
<input type="checkbox"/>	Haemophilus influenzae type B (HIB)		Oui
<input type="checkbox"/>	Pneumocoque	Conjugué et/ou polysaccharidique, selon vaccination antérieure	Oui
<input type="checkbox"/>	Hépatite A		Non
<input type="checkbox"/>	Hépatite B		Oui
<input type="checkbox"/>	VPH		Oui (9 à 45 ans*)
<input type="checkbox"/>	Zona (Shingrix)	<ul style="list-style-type: none">• Gratuit pour : 75 ans et + / 18 ans et + si immunosupprimé• Après un zona, attendre 1 an avant de vacciner• Après zona ophtalmique, attendre 6 mois après la fin du tx	Oui
<input type="checkbox"/>	COVID	L' intervalle entre les doses dépend de l'âge et de l'état de santé de la personne.	Oui

*<https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-les-infections-par-les-vph>

Médecin: _____ Date: _____

Par Dre Hélène Veillette (dermatologue) et Marie-Ève Fortier, inf. clin. (version 03-2025)