

# Upadacitinib Rinvoq®

## C'est quoi?



L'upadacitinib est utilisé pour traiter l'eczéma et d'autres maladies inflammatoires.

## Comment le prendre?



Il est offert en comprimés de 15 mg et de 30 mg. La dose sera déterminée par votre médecin.



On le prend une fois par jour, avec de la nourriture.



Ce médicament agit plutôt rapidement. Par contre, il peut parfois prendre quelques semaines avant d'agir.

## Il est important de:



Faire les prises de sang demandées avant et pendant le traitement. Un suivi avec votre médecin est important.



Discuter de la vaccination avec votre médecin. Le risque de zona étant un peu augmenté, le vaccin contre le zona pourrait vous être recommandé.



Contactez votre médecin si vous voulez arrêter ce médicament.

## Quels effets secondaires?

Il est possible de ne pas se sentir bien en prenant l'upadacitinib. Il peut causer:



- Nausée, maux de ventre



- Symptômes de rhume (toux, fatigue, malaises généraux)
- Susceptibilité aux infections



- Maux de tête



- Anémie, baisse des globules
- Augmentation du cholestérol et des enzymes dans le foie. Il est important de faire vos prises de sang.



- Acné, généralement légère



- Rarement, des caillots sanguins (ex.: phlébite)
- Consultez votre médecin si vous remarquez de l'enflure, de la douleur ou de la sensibilité à une jambe, ou si vous êtes essoufflé(e).



- Évitez le jus de pamplemousse et le millepertuis (St John's-wort) en prenant ce médicament.



- Certains médicaments peuvent interagir avec l'upadacitinib. Parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

## Consultez votre médecin si:



- Vous ne vous sentez pas bien.
- Vous voulez arrêter le médicament.
- Vous avez arrêté le médicament.



- Vous avez des effets secondaires.



- Vous faites de la fièvre ou avez une infection. Il faut généralement cesser le médicament jusqu'à la résolution de l'infection.



- Vous êtes enceinte ou allaitez.
- Vous voulez tomber enceinte.
- Les effets de ce médicament sur la grossesse et l'allaitement n'ont pas encore été étudiés. Il faut donc l'éviter.



- Vous aurez une chirurgie. Il faut généralement cesser le médicament avant une chirurgie majeure.

## Notes:

---

---

---

---

---

---

---