

Finastéride Proscar® ou Propecia® Dutastéride Avodart®

C'est quoi?



Le finastéride et le dutastéride sont utilisés pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate. On les utilise aussi pour traiter la perte de cheveux (certaines formes d'alopecie).

Comment le prendre?



Il est offert en comprimés. La dose sera déterminée par votre médecin selon le médicament.



On le prend une fois par jour, avec de la nourriture.



Ce médicament peut parfois prendre 4 à 6 mois avant de stabiliser une perte de cheveux.

Il est important de:



Ne pas tomber enceinte ni allaiter. La contraception est recommandée. Si vous prévoyez une grossesse ou que vous êtes enceinte, contactez votre médecin.

Effets secondaires

(Rares, entre 1 et 4% des gens):

Les effets secondaires peuvent diminuer en prenant le médicament 3 jours par semaine.

Il peut causer chez les femmes:



- Nausée, maux de ventre



- Maux de tête



- Bouffées de chaleur



- Diminution de la libido

Il peut causer chez les hommes:



- Augmentation du volume des seins



- Diminution de la libido
- Trouble de l'érection



- Douleurs musculaires

Consultez votre médecin si:



- Vous avez des effets secondaires.



- Vous êtes enceinte.
- Vous allaitez.
- Vous voulez tomber enceinte.
- Vous avez des problèmes de fertilité connus.

Informations supplémentaires:



- Pour les hommes: si vous désirez procréer, il n'est pas nécessaire d'arrêter le finastéride, sauf si vous avez des problèmes de fertilité connus.



- Pour les femmes: si vous désirez procréer, il faut arrêter le finastéride 1 mois avant, ou 6 mois avant si vous utilisez le dutastéride.

Notes:
