

- S'applique à tous ou...
    - **Spécifique à Upadacitinib (Rinvoq / DA, 12 ans et +)**
    - **Spécifique à Ritlecitinib (Litfulo / Pelade, 12 ans et +)**
    - **Spécifique à Abrocitinib (Cibinqo / DA, 12 ans et +)**
    - **Spécifique à Baricitinib (Olumiant / Pelade, 18 ans et +)**
- Deucravacitinib (Sotyktu) ne requiert pas de suivi de labos d'emblée, seulement un Test pour le TB en début de traitement.

SITUATION	SUIVI DES LABORATOIRES POUR LES INHIBITEURS DU JAK									
Possibilité de grossesse	B-HCG / valider contraception									
Insuffisance hépatique	Éviter en cas d'insuffisance hépatique sévère									
Avant le tx	FSC  Ne pas débuter si: -Lympho <0,5 x 10 <sup>9</sup> -Neutro <1 x 10 <sup>9</sup> -Hb <0,8 x 10 <sup>9</sup> -Plaquettes <150 x 10 <sup>3</sup> -Plaquettes <100 x 10 <sup>3</sup>	ALT	Bilan lipidique	Sérologies hépatites  (Anti-HBs, Anti-HBc, HBsAg, Anti-VHC)	Test pour TB	Creat ↓ Cl creat < 60 mL/min ↓ Donner demi-dose	Creat ↓ Cl creat < 30 mL/min ↓ contre-indiqué	Creat ↓ Cl creat 30 à 60 mL/min ↓ si dose prévue = 4 mg : donner 2 mg si dose prévue = 2 mg : contre-indiqué	Creat ↓ Cl creat < 30 mL/min ↓ 15 mg die	Creat ↓ Cl creat > 30 mL/min ↓ Dose standard
À 4 sem, 12 sem, puis environ 2 fois par année (selon jugement du médecin)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">FSC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lymphocytes                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 0,5 x 10<sup>9</sup> → </li> <li>0,5 - 0,8 x 10<sup>9</sup> → Répéter dans 4 sem</li> </ul> </li> <li>Neutrophiles                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 1 x 10<sup>9</sup> → </li> <li>1 - 1,5 x 10<sup>9</sup> → Répéter dans 4 sem</li> </ul> </li> <li>Hb                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 0,8 x 10<sup>9</sup> → </li> </ul> </li> <li>Plaquettes / Plaquettes                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 50 x 10<sup>3</sup> → </li> <li>50 - 150 x 10<sup>3</sup> → Répéter dans 4 sem</li> </ul> </li> </ul> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">ALT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>≥ 3 x limite sup ↓ cause? ↓</li> <li>Atteinte hépatique médicamenteuse → </li> <li>Consult gastro?</li> </ul> </div> </div>									
À 12 sem	Bilan lipidique → anormal → Prise en charge selon les lignes directrices									
Seulement si symptômes (douleur musculaire/faiblesse, sans étiologie)	<p style="text-align: center;">CK</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">≥ 5 x limite sup</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Répéter dans 2 semaines → Persiste?</p> <p style="text-align: center;">Non = poursuivre le tx</p> <p style="text-align: center;">Oui </p>									